T. C.
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

ORGANİK GÜBRE TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	UNİFORMAGRO TARIM İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Lisans Türü	ÜRETİCİ
Lisans No	1127
Ürünün	
Türü	ORGANİK GÜBRE
Tip İsmi	BİTKİSEL MENŞELİ AMİNO ASİT İÇEREN KATI ORGANİK GÜBRE
Cinsi	KATI
Verilen Tescil No	8684
Marka veya Ticari Adı (Varsa)	UNIQUE AMİNO TOTAL
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı	UNİFORMAGRO TARIM İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Tip İsmi	BİTKİSEL MENŞELİ AMİNO ASİT İÇEREN KATI ORGANİK GÜBRE
Üretildiği Ülke (Türkiye veya İthalat)	İTHAL
Beyan Edilen Özellikler	
Toplam Organik Madde %	60
Organik Karbon %	15
Organik Azot %	4
Serbest Aminoasitler %	22
Maksimum Nem %	20
pH	3-5
Ürünün Garanti Edilen Net Ağırlıkları veya Hacimleri	0,4-1-5-10-15-20-25-30-35-40-45-50 Kg
Diğer İşaretler	ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ VE DİĞER GÜVENLİK TEDBİRLERİ
Veriliş Nedeni	ÜRÜN TİP ADI DÜZELTİLDİ.
* Ad ve adres değişiklikleri 30 gün içinde Bakanlığa bildirilecektir.	
Bu belge 23.12.2015 Tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.	

29/03/2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tarımda Kullanılan Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikle ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik" gereği düzenlenmiştir.

Tarih: 05.02.2016

Daire Başkanı

ORGANİK GÜBRE
BİTKİSEL MENŞELİ AMİNOASİT İÇEREN KATI ORGANİK GÜBRE
Unique AMİNO TOTAL

Garanti edilen içerik	%w/w
Organik Madde	60
Organik Karbon	15
Organik Azot (N)	4
Serbest Aminoasitler	22
Maximum Nem	20
Ph	3-5

KULLANILDIĞI BİTKİ VE UYGULAMA ŞEKLİ

ENDÜSTRİ BİTKİLERİ	Uygulama	KULLANIM ŞEKLİ	Zamanı	MİKTARI ml/da
Şekerpancarı	İlk		3-5 yapraklı döneminde	40
	İkinci		3 hafta sonra	60
Ayçiçeği	İlk		3-5 yapraklı döneminde	40
	İkinci		3 hafta sonra	60
Pamuk	İlk		3-5 yapraklı döneminde	40
	İkinci		Toprakta	50
	Üçünü		Çiçeklenme Döneminde	50
Mısır	İlk		Bitki 30 cm olduğunda	40
	İkinci		Püskül oluşum öncesi	60
Tütün	İlk		3-5 yapraklı döneminde	40
	İkinci		Çiçeklenme başlangıcında	50
Soya	Devamında		Her 4 haftada	50
	İlk		Çiçeklenme öncesinde	40
Kolza(Konala)	İkinci		3 hafta sonra	60
	İlk		3-5 yapraklı döneminde	40
	İkinci		Çiçeklenme öncesinde	60

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
23 -12- 2015

TARLA BİTKİLERİ				
Baklagiller	İlk		Çiçeklenme öncesinde	40
Yerfıstığı	İkinci		3 hafta sonra	50
Patates	İlk		Çiçeklenme öncesinde	40
	İkinci		3 hafta sonra	50
Hububat	İlk		3-5 yapraklı dönemde	40
	İkinci		Ot ilacı ile	40
	Veya		Ot ilacı ile birlikte bir kez	80
Kimyon	İlk		Çiçeklenme öncesinde	40
	İkinci		3 hafta sonra	50
Kavun	İlk		3-5 yapraklı dönemde	40
Karpuz	İkinci		Çiçeklenme döneminde	50
	Üçüncü		Meyve 100 g olduğunda	60
Çilek	İlk		Şaşırtma sırasında	40
	İkinci		Çiçeklenme öncesinde	50
	Sonraki		Her 3 haftada	60
Şerbetçiotu	İlk		Büyümenin ortasında	30
	İkinci		3 hafta sonra	40
	Üçüncü		3 hafta sonra	50

UNİFORMAGRO TARIM İTH. İHR. SAN. VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
GÜVENLİK MAH. TURGUT REİS CAD. TACİTİN KARATAŞ APT. K:1 S:4/NO:11 MURATPAŞA / ANTALYA
A.KUDUMLAR 8920311141

Sebahat ULUŞAN
Ziraat Mühendisi

YEM BİTKİLERİ			
Yonca-Korunga		Her Biçimden Sonra	40
Fiğ		ilk çıkıştan 1 ay sonra	60
SÜS BİTKİLERİ			
KESME ÇİÇEK	İlk	DİKİMDE	50
	İkinci	10 gün sonra	50
	Sonraki	Her 10 günde	50
Yeşil alan	İlk	Mayıs başında	30
	İkinci	Temmuz ortasında	40
	Üçüncü	Eylülün ortasında	50

SERACILIK		MİKTAR	
Uygulama	Zamanı	Yapraktan	Damlama İle
İlk	Dikimde	60 ml/da	200 (100ltsu/g)
İkinci	2 hafta sonra	60 ml/da	200 (100ltsu/g)
Sonraki	Her 10 günde	60 ml/da	200 (100ltsu/g)

23 -12- 2015

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

UYARILAR

- Asla uygun doz miktarını aşmayınız.Sadece gerekli yerlerde kullanınız
- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız
- ÇOCUKLARDAN VE GIDALARDAN UZAK TUTUNUZ
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.

FİRMA BEYANI :
İmalatcı firma ,tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder.Ancak hatalı kullanım ve karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır.Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır..

DEPOLAMA SARTLARI:Orjinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz.Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız.Normal Şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder.Depolama sıcaklığı 0 -40 °C arasındadır.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ: Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve kalıntı bırakmaz.

Bakanlık Tescil No :
Bakanlık Lisans No :
Parti No
Son Kul.Tarihi
Net Ağırlık :
Üretim Tarihi:

İTHALATCI FİRMA: UNİFORMAGRO TARIM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi: GÜVENLİK MAH. TURGUT REİS CAD. TACİTTİN KARATAŞ APT. K:1 D:6 NO:113 MURATPAŞA / ANTALYA
Tel: 0242 3460203 Fax: 0242 3460203
www.uniformagro.com

Piyasaya sunacağımız ürün üzerindeki etiket bilgisinin aynısını olacağını taahhüt eder aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

UNİFORMAGRO TARIM İTH. İHR. SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ
GÜVENLİK MAH. TURGUT REİS CAD. TACİTTİN KARATAŞ APT. K:1 D:6 NO:113 MURATPAŞA / ANTALYA
A.KURULLAR 9720311141

Sebahat ULUSAN
Ziraat Mühendisi

MEYVELER			
Turunçgiller	İlk	Çiçeklenme döneminde	40
	İkinci	Meyve oluştuğunda	50
	Üçüncü	3 hafta sonra	50
Üzüm	İlk	Sürgün 30 cm olduğunda	40
	İkinci	Çiçeklenme öncesi	50
	Üçüncü	Çiçeklenme sonrası	50
Elma-Armut	İlk	Çiçeklenme sonrası	50
	İkinci	Meyve oluştuğunda	60
Erik-Kiraz	İlk	Çiçeklenme döneminde	50
Şeftali-Kayısı	İkinci	3 hafta sonra	60
Zeytin-Ceviz	İlk	Sürgün 10 cm olduğunda	40
	İkinci	Hasattan 3 hafta önce	50
Muz	İlk	İlkbaharda büyüme başladığında	40
	İkinci	3 hafta sonra	50
	Üçüncü	3 hafta sonra	50
İncir	İlk	İlkbaharda büyüme başladığında	60
	İkinci	3 hafta sonra	60
Nar-Kivi	İlk	Çiçeklenme öncesi	40
	İkinci	Çiçeklenme sonrası	50

23 -12- 2015

SEBZELER	KULLANIM ŞEKLİ UYGULAMA	ZAMAN	MİKTAR ml/Ad
Domates	İlk	3-5 yapraklı döneminde	40
	İkinci	Çiçeklenme başlangıcında	50
	Sonraki	Her 3 haftada	50
Patlıcan	İlk	3-5 yapraklı döneminde	40
Biber	İkinci	Çiçeklenme başlangıcında	50
	Üçüncü	İlk meyve oluşumunda	50
	Sonraki	Her 3 haftada	60
Karnabahar	İlk	3-5 yapraklı döneminde	40
Brokoli-Lahana	İkinci	3 hafta sonra	50
	Üçüncü	Boş oluşumu sırasında	50
Marul	İlk	3-5 yapraklı döneminde	40
	İkinci	2 hafta sonra	40
Salatalık-Acur	İlk	3-5 yapraklı döneminde	30
	İkinci	2 hafta sonra	30
	Sonraki	3-5 yapraklı döneminde	40
Soğan-Pırasa	İlk	Çiçeklenmeden 2-3 hafta sonra	30
Havuç-Turp	Sonraki	Her 2 haftada	40
Enginar	İlk	Bitki 30 cm olduğunda	40
	İkinci	Baş oluşumunda	50
Maydanoz	İlk	3-5 yapraklı döneminde	60
	İkinci	3 hafta sonra	60
	üçüncü	İlk kesimde	60

UNİFORMAGRO TARIM İTH. İHR. SAN. VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
GÜVENLİK MAH. TURGUT REİS CAD. TACİTİN KARATAŞ APT. K:1/D:5 NO:113 MURATPAŞA / ANTALYA
A.KURULLAR 8920311141

Sebahat ULUŞAN
Ziraat Mühendisi